



FICHA DE LECTURA Nº 20

PARA RÁPIDO ALIVIO DE:

Trastornos estomacales – Hiperacidez gástrica – Excesos de comida y bebida – Dolores de cabeza – Neuralgias – Fatiga y dolores musculares – Síntomas de resfriado

INSTRUCCIONES

Vía oral.

ALKA-SELTZER debe tomarse siempre disuelto en agua.

ADULTOS: 1 ó 2 comprimidos disueltos en agua hasta un máximo de 10 comprimidos al día.

NIÑOS: la mitad de la dosis. Para niños menores de 3 años consultar a su médico.

Cada comprimido contiene

| | |
|------------------------|----------|
| Ácido Acetilsalicílico | 0,32 gr. |
| Fosfato Monocálcico | 0,20 gr. |
| Bicarbonato de Sodio | 1,90 gr. |
| Ácido Cítrico | 1,05 gr. |

ALKA – SELTZER disuelto en agua se transforma en:

| |
|-------------------------|
| Acetilsalicilato Sódico |
| Fosfato Sódico Cálcico |
| Bicarbonato de Sodio |
| Citrato Sódico |

Registrado en la D G F M con el nº E N 40876
Fabricado en España por:
BAYER



Cad.: ENE 2008

Lote: V – 008/ 2



P.V.P. 2,5 € Imp. Incl.

OBSERVO Y CONTESTO:

1. ¿Cuándo se debe tomar este medicamento?

Dolores de cabeza – Mala visión – Estreñimiento – Anemia – Picazón de la piel – Diarrea – Estado nervioso

2. Un niño de 9 años, ¿cuántos comprimidos puede tomar al día?

3. ¿Cuál es la fecha de caducidad del medicamento?

4. ¿El día 18 de Marzo de 2008 podré tomarme este medicamento? ¿Por qué?

5. ¿Cómo podré tomarme este medicamento?