



## FICHA DE LECTURA Nº 21

### SEDOFARIN® SPRAY

#### COMPOSICIÓN

Cada ml contiene: Cloruro de decalinio (DCI).....	1,00 mg
Tirotricina (DCI) .....	0,50 mg
Dexametasona (DCI) .....	0,20 mg
Benzocaína (DCI) .....	10,00 mg
Excipientes: sacarina sódica, etanol (96% v/v) y esencia c.s.	



#### Cada aplicación contiene:

Cloruro de decalinio (DCI).....	0,170 mg
Tirotricina (DCI) .....	0,085 mg
Dexametasona (DCI) .....	0,034 mg
Benzocaína (DCI) .....	1,700 mg
Excipientes: sacarina sódica, etanol (96% v/v) y esencia c.s.	

#### INDICACIONES

Tratamiento preventivo y curativo de los procesos patológicos de la garganta y cavidad bucal, producidos por gérmenes sensibles a los componentes de esta especialidad. Faringitis agudas y crónicas, amigdalitis y poriamigdalitis, gingivitis, estomatitis, aftas.

#### POSOLOGIA

Una aplicación cada dos o tres horas.

#### NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Abrir la boca y dirigir la boquilla inhaladora hacia la zona afectada (garganta, boca, lengua, etc.), y presionar a fondo la parte superior de la cápsula.

#### CONTRAINDICACIONES


No se han descrito.

#### ADVERTENCIA

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.

#### INTERACCIONES

No se han descrito.



#### EFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito

#### PRECAUCIONES

Por contener etanol como excipiente, puede ser causa de riesgo en pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia y en mujeres embarazadas y niños.

#### INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

Es prácticamente imposible que se produzcan intoxicaciones. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20

#### OBSERVO Y CONTESTO:

1. ¿Cómo se llama el medicamento cuyo producto tienes delante?
2. ¿Qué contraindicaciones tiene?
3. ¿Para qué enfermedades es recomendable su uso? (Rodea lo correcto):  
Diarreas – Vómitos – Hepatitis – Faringitis – Amigdalitis – Úlcera – Estomatitis – Reuma – Estrés.
4. ¿Cada cuánto tiempo puede aplicarse el spray?
5. ¿Dónde se aplica el spray? (Rodea lo correcto):  
Oído – Nariz – Ojo – Garganta – Boca – Lengua – Rodilla

